




すい臓がんリスク検査 (APOA2アイソフォーム・CA19-9)

＜すい臓がんの特徴＞

すい臓がんは、がんが発生しても小さいうちは症状が出にくく、早期の発見は簡単ではありません。

わが国では、年間約4万人*の方がすい臓がんで亡くなっています。

ステージ別5年生存率(2014-2015年集計)*



* 出典：国立研究センターがん情報サービス がん登録・統計 一部抜粋

＜すい臓がんのリスク因子＞

- すい臓がんの家族歴
- 生活習慣病(糖尿病・肥満)
- 遺伝性
- すい疾患(慢性すい炎など)
- 嗜好(喫煙・飲酒)
- その他(胆石など)




出典：肺癌診療ガイドライン2022年版 一部抜粋

＜すい臓がんリスク検査について＞

血液検査で、新たに導入した **APOA2 アイソフォーム** と従来の腫瘍マーカー **CA19-9** を組み合わせることで、すい臓がんの早期発見が期待できます。

＜APOA2アイソフォーム検査について＞

- * 血液中にあるAPOA2というタンパク質には主に3つのタイプ(アイソフォーム)があり、健康な人はそのバランスが一定に保たれていますが、すい臓がんになると、このバランスが崩れてきます。
- * APOA2アイソフォーム検査は、このバランスを示す指標「APOA2-i Index」を用いて判定を行います。
- * 従来の腫瘍マーカーとは異なる物質を測定するため、これまで検出されなかったすい臓がんを見つけられる可能性があります。



出典：Honda K, et al. PLoS One. 2012; 7; e46908

＜検査の注意点＞

- APOA2-i Index および CA19-9 が基準値外であっても、すい臓がんとは限りません。また基準値内であってもすい臓がんではないとは限りません。
- APOA2-i Index はすい炎などのすい疾患に罹患されている方でも基準値から外れる場合があります。
- 本検査の結果のみですい臓がんの診断はできませんので、必ず他の関連する検査結果や臨床情報などと合わせた医師による総合的な診断を受けてください。

一般社団法人寒河江市西村山郡医師会 **総合健診センター**
 For healthy and happy life. ☎ 0237-84-0800